

# 喘寶定量吸入劑 操作說明



## 準備作業

第一次使用吸入器之前，應釋放一劑藥物至空氣中，以確保吸入器妥善運作。

計數器 / 指示器

121

壓一次

計數器 / 指示器

120

## 吸入器使用步驟

吸入時請處於站姿或坐姿。

無塑膠延伸管

有塑膠延伸管

第 1 步驟



- 取下保護蓋，確認吸嘴乾淨，沒有灰塵和髒汙。若有需要，可選擇在吸入口接上塑膠延伸管

第 2 步驟



- 避開藥物吸嘴，緩慢吹出一大口氣

第 3 步驟





- 垂直握著吸入器
- 牙齒打開將吸嘴含緊含密

第 4 步驟



- 由上往下按壓藥瓶，同時緩慢深吸氣
- 持續緩慢深吸氣約 4 - 5 秒

第 5 步驟



- 嘴巴離開吸嘴，閉氣 5 - 10 秒
- 檢查劑量計數器的讀數已經減 1
- 若要吸入第二口，請保持吸入器直立約半分鐘，再重複步驟 2 到步驟 5

## 結束後

請以水潤洗口腔或漱口（不可吞下）。



如果您發現自己很難在開始吸氣時使用吸入器，可以搭配使用 AeroChamber Plus 輔助器裝置。

## 吸入器使用之常見問題



### 如何儲存喘寶？

在醫療院所裡喘寶是存放在冰箱（2 - 8°C），當您領藥後，在未開封的情況下，請保存於冰箱（2 - 8°C）。

開封後，只要保存在室內陰涼處（25°C 以下），最長可存放 4 個月。



掃描上方 QR code  
觀看喘寶衛教影片  
(中文)



掃描上方 QR code  
觀看喘寶衛教影片  
(印尼)



掃描上方 QR code  
觀看喘寶衛教影片  
(菲律賓)



掃描上方 QR code  
觀看喘寶衛教影片  
(越南)



吸入器背面有劑量計數器 / 指示器，可顯示剩餘劑量數

參考資料：喘寶定量吸入劑中文仿單。

喘寶 定量吸入劑 100/6/12.5 mcg/dose

衛部藥輸字第 027672 號

主要成分	Beclometasone dipropionate / formoterol fumarate dihydrate / glycopyrronium bromide。
適應症	用於重度以上呼氣氣流受阻 (FEV <sub>1</sub> 少於預測值之 50%) 及有惡化病史之慢性阻塞性肺病 (COPD) 成年病人，在已使用吸入型皮質類固醇與長效 beta 2 致效劑合併療法仍未得到充分治療時，作為維持治療使用，以控制症狀及降低反覆惡化發生。
用法用量	成人建議劑量為每天兩次，每次吸入兩劑。最大劑量為每天兩次，每次吸入兩劑。
不良反應	最常通報的不良反應是口腔念珠菌症、肌肉痙攣、口乾。
禁忌症	對活性物質或對任一項賦形劑 (Ethanol anhydrous、Hydrochloric acid、Norflurane) 過敏。

本藥需經醫師處方，詳細資訊請見仿單內容

Trimbow®

Chiesi

友華生技

友華生技醫藥股份有限公司  
地址：台北市北投區承德路六段 128 號 13 樓  
TRI-2021-001

資料僅供醫護專業人員參考